


## 檢查前預備

1. 要有適當之避孕措施，以確定是在無懷孕之狀況下接受檢查，以防引致流產。
2. 若月經週期延誤，可能需留小便作驗孕。



3. 月經期間不能施行是項檢查；故請儘早致電聯絡婦科門診部護士，以便安排改期。
4. 如身體不適或正服用藥物，請知會日間中心之當值護士。
5. 可如常飲食。
6. 請帶備衛生巾。

電話號碼：2683 8351 (北區醫院)  
2689 2399 (大埔那打素醫院)

## 檢查後需知

1. 通常會有少量陰道出血，約維持五至七天。
2. 檢查後，休息半小時，生命表徵無異常，便可出院。
3. 需要時，醫生會給予止痛藥、止血藥或荷爾蒙等；請按指示服用。



4. 請按時回院覆診。
5. 可維持一般日常活動及飲食。



6. 請暫停性生活，直至陰道出血完全停止後 2 星期才恢復。



醫院管理局  
新界東醫院聯網  
Hospital Authority  
New Territories East Cluster




## 宮腔窺鏡

新界東醫院聯網

婦產科

## 宮腔窺鏡



## 簡介

宮腔窺鏡是一支類似小型望遠鏡之儀器，接駁視象系統應用，以診視子宮腔內部之情況；配合其他儀器，可作簡單之治療程序，如摘除瘰肉、移除子宮環等。



施行程序約需時十分鐘。

## 施行步驟

1. 醫生使用「陰道窺器」張開陰道以顯露宮頸口(程序如一般婦科檢查)。
2. 將「宮腔窺鏡」經宮頸口放置子宮腔內，接駁視象器材以診視子宮腔內部之情況。
3. 需要時，會利用儀器擴張子宮頸，以便放置窺鏡，
4. 過程中，會注入二氧化碳或生理鹽水以協助檢查；可能會導致有輕微不適感覺。
5. 病人可由電視螢幕，目睹子宮內部之狀況。
6. 需要時，可配合其他儀器作簡單之診繼或治療程序。



## 適應症

1. 不正常子宮出血，例如：
  - 月經量異常
  - 月經週期紊亂
  - 經期間出血
  - 停經後出血
2. 作鑑別及診斷異常情況，如：
  - 瘰肉
  - 子宮肌瘤
  - 宮內膜增生
  - 癌症

## 併發症

1. 可能會有腹部脹痛，感覺如行經時之子宮收縮痛，肩痛或鬱悶，可服用止痛藥緩解。
2. 子宮穿破，但極罕見。