

## 手術前預備


1. 麻醉評估 - 麻醉科醫生會為病人作手術前評估，並解釋有關之麻醉方式、風險及術後止痛方法。



2. 禁食預備 - 如採用全身麻醉者，需按麻醉科醫生指示，依時停止進食及進水。



3. 皮膚清潔 - 因會在肚臍下作手術切口，故請注意臍部清潔。



4. 進入手術室前，須移除身上各物，如：假牙、隱形眼鏡、眼鏡及各類手飾等；特別是金屬類物品，以防使用電烙時燒傷皮膚。

## 手術後須知

1. 傷口料理
  - 傷口毋需拆線。
  - 手術後第三日，可除去覆蓋傷口之紗布。
  - 除去紗布後，可如常沐浴。
  - 傷口上之透明膠布會自動脫落。
  - 勿用任何消毒藥液清洗傷口。

2. 間中會出現打嗝或肩膊痛之現象；此乃腹腔內之二氧化碳氣體刺激橫膈膜而導致。儘早下床活動可促進氣體吸收，不適情況會得以緩解。

3. 傷口會有不同程度之痛楚，故醫生會按病人情況而處方合適止痛藥物。需要時，請向當值護士索取。



4. 可能有少量陰道出血，約維持三至五天。

5. 日常活動
  - 可維持一般日常活動及工作。
  - 不會影響性生活，但請於陰道出血完全停止後才恢復。


## 腹腔窺鏡

## 手術圖樣

## 優點

## 常見婦科腹腔鏡手術

1. 傷口細小，復原較快。



2. 較少痛楚。



- ▶ 診斷性腹腔窺鏡
- ▶ 輸卵管結紮絕育術
- ▶ 黏連物鬆解術
- ▶ 卵巢囊腫切除術
- ▶ 卵巢、輸卵管切除術
- ▶ 輸卵管造口術
- ▶ 子宮肌瘤切除術
- ▶ 子宮切除術

## 手術簡介

腹腔窺鏡為微創性手術，可在局部或全身麻醉下施行。

手術時，在臍下作小切口以放入腹腔窺鏡，並在恥骨聯合或左右腹下部作一至兩個細小切口，作放置其他儀器之用，以協助及配合手術之施行。

施行過程中，會輸入二氧化碳氣體以脹大腹腔，方便手術進行。

3. 縮短住院時間

一般情況下，手術後一至二天便可出院。



## 手術切口位置