

根管治療



香港中文大學 保健處 牙科部

病人亦需知悉以下可能發生的情況：

1. 手術後一般在首一兩天或許有痛楚和不適，有需要時可服用止痛藥。
2. 細小工具有可能在清理根管時，分離並藏於根管內，因應不同情況，牙醫會建議讓分離部份留下或以手術除去。
3. 沖洗根管的藥液或會溢出牙根尖，引起附近牙肉組織發炎；唯嚴重的過敏反應情況並不常見。
4. 進行根管治療後，偶爾會發生再生性膿腫，導致面部腫痛。病人需要盡快約見牙醫處理，這情況可能需要服用止痛藥及抗生素治療。
5. 如有需要，病人或需要被轉介約見牙髓治療科專科醫生。



根管治療後的護理小貼士

- i. 保持良好口腔衛生
- ii. 定期清潔及檢查。
- iii. 避免咀嚼硬食物傷害牙齒



香港中文大學

☎ : 3943 6412

www1.uhs.cuhk.edu.hk

根管治療


根管治療，又稱「杜牙根」，是牙科治療的一種，用於移除發炎或壞死牙髓組織。當中的過程包括：打開齒冠移除病壞牙髓組織、清潔及消毒根管、填充根管及封密牙齒。以達到保存珍貴自然牙齒，免遭到拔除的命運。

根管治療的過程

在進行根管治療前，應諮詢牙醫意見。根管治療通常不是單一次治療，病人或需要多次應診才能夠完成整個治療。


那些牙齒需要根管治療？

- 蛀牙太深至牙髓，引起急性、慢性牙髓炎
- 牙髓長期受刺激，引至牙髓壞死
- 牙齒受到撞擊折斷，傷及牙髓神經
- 曾經做過根管治療，但尚未完全治療好的牙齒



5 治療完成後，牙齒或會變得脆弱及容易折斷，因此需視乎牙齒的缺損程度，或需補上牙樁，及或牙冠以作保護，避免牙齒再受損害。

1 進行X光檢查以確定壞牙位置。



2 為確保在治療進行中不會感到痛楚，會局部麻醉受影響牙齒。

3 利用已消毒的儀器及藥物將患牙開出通道、清理和沖洗發炎及受感染的牙髓管道。

4 用補充物料完全填充根管牙根，以防止細菌再度感染。

