

### 清理禽鳥排泄物及禽鳥屍體指引

#### (1) 次氯酸鈉消毒劑（漂白水）

- a. 次氯酸鈉消毒劑，通稱「漂白水」，是一種非常強力的消毒劑，如採取適當的措施，應可安全使用。
- b. 漂白水在超級市場有售。普通漂白水可含達 5.25%的次氯酸鈉，濃縮漂白水的次氯酸鈉含量則有 6%。
- c. 大學安全事務處備有濃縮次氯酸鈉消毒劑，可供有需要部門作消毒之用（電話：3943-7958）。
- d. 清理禽鳥排泄物前，應先用含 0.1%次氯酸鈉的漂白水（1 份家用漂白水加 49 份水）將禽鳥排泄物潤濕。

#### (2) 稀釋漂白水的安全措施

- a. **注意事項：**
  - 切勿把漂白水與酸性或鹼性清潔劑混合。
  - 切勿用熱水去稀釋漂白水。
  - 切勿使用未經稀釋的漂白水。
  - 漂白水應儲存在安全的地方，避免陽光照射或高溫受熱。
  - 盛載漂白水的容器必須附有適當標貼。
  - 經稀釋的漂白水應該在準備後 24 小時內使用，以達致有效消毒。存放時間越長，分解量越多。
  - 如有疑問，應致電大學安全事務處（電話：3943-7958）查詢。
- b. **個人保護：**
  - 應在空氣流通良好的地方稀釋漂白水。
  - 稀釋漂白水前，應戴手套、口罩及護眼罩／化學品防護面罩。
  - 按工作需要去調製足夠用量的稀釋漂白水，製造過量化學品會產生額外的風險和浪費。
  - 如身體接觸到次氯酸鈉溶液，應即時以大量清水沖洗。

#### (3) 使用稀釋漂白水

- a. 在空氣流通的地方稀釋或使用漂白水。
- b. 稀釋及使用漂白水時須佩戴適當個人防護裝備(如口罩、手套、護眼罩及膠圍裙)。
- c. 稀釋時要用冷水，因為熱水會令主要成分分解，失去效能。
- d. 經常接觸的地方、家具、地面、廁所和浴室須定期清潔及消毒，每日用 1 比 99 稀釋家用漂白水（把 1 份含 5.25% 次氯酸鈉的家用漂白水與 99 份清水混和）清潔消毒，待 15-30 分鐘後，用水清洗並抹乾。
- e. 若有被嘔吐物、排泄物或分泌物污染的地方，應先用吸水力強的即棄物料清除可見的污垢，再用 1 比 49 稀釋家用漂白水（把 1 份含 5.25% 次氯酸鈉的家用漂白水與 49 份清水混和）消毒，待 15-30 分鐘後，用水清洗並抹乾。
- f. 如有血液濺溢，應先用吸水力強的即棄物料清除可見的污垢，再用 1 比 4 稀釋家用漂白水（把 1 份含 5.25% 次氯酸鈉的家用漂白水與 4 份清水混和）消毒，待 10 分鐘後，再用清水沖洗及抹乾。
- g. 使用湯匙或量杯準確地量度所需漂白水的份量。

- h. 完成程序後，必須徹底洗手。

#### (4) 清理公共範圍的禽鳥排泄物的步驟

- a. 清潔人員在清理禽鳥排泄物時，必須戴上合適的手套及口罩。
- b. 先用 1 比 49 稀釋家用漂白水將禽鳥排泄物潤濕，待過了一分鐘後，方才清理。
- c. 應小心使用稀釋漂白水，避免影響其他途人。
- d. 與消毒劑混和的禽鳥排泄物可放入垃圾袋，或以大量清水沖走。
- e. 如表面仍留有禽鳥排泄物的殘漬，可再使用稀釋漂白水清理。先等數分鐘讓清潔劑將殘漬軟化，然後將污漬擦掉。
- f. 清理完成後，必須用 1 比 49 稀釋家用漂白水洗刷鞋底，以清除黏附的禽鳥排泄物，隨後以梘液及清水徹底清洗手套及雙手。

#### (5) 清理汽車上的禽鳥排泄物的步驟

- a. 有關人員在清理禽鳥排泄物時，必須戴上合適的手套及口罩。
- b. 先用 1 比 49 稀釋家用漂白水將禽鳥排泄物潤濕，待過了一分鐘後，方才清理。
- c. 用布擦掉汽車表面的禽鳥排泄物，然後把用過的抹布放進垃圾袋內。
- d. 用另一塊布以清水洗掉殘留的漂白水。
- e. 清理完成後，必須用 1 比 49 稀釋家用漂白水洗刷鞋底，以清除黏附的禽鳥排泄物，隨後以梘液及清水徹底清洗手套及雙手。

#### (6) 在校園發現禽鳥屍體

- a. 當發現禽鳥屍體，應通知大學保安處 (電話：3943-7999)。
- b. 保安處會圍封發現禽鳥屍體的地方，並致電政府熱線 1823 通知漁農自然護理署安排移走禽鳥屍體。

#### (7) 清理禽鳥屍體的步驟

在特殊情況下，假若漁農自然護理署未能提供服務，需由校內職員處理禽鳥屍體：

- a. 保安處會圍封發現禽鳥屍體的地方，並通知物業管理處安排移走禽鳥屍體。
- b. 處理禽鳥屍體前，清潔人員必須穿著合適的個人保護裝備，包括防水膠手套、外科口罩及即棄圍裙。
- c. 用 1 比 4 稀釋家用漂白水 (把 1 份含 5.25% 次氯酸鈉的家用漂白水與 4 份清水混和) 浸濕即棄吸水布，用該吸水布或漂白粉覆蓋禽鳥屍體最少 15 分鐘，然後用鉗將禽鳥屍體放進厚身黑色垃圾袋內。過程中，必須注意避免揚起鳥屍身上的灰塵。
- d. 把禽鳥屍體放進垃圾袋後，加入數杯分量的漂白粉，將袋口綁緊。
- e. 把載有禽鳥屍體的膠袋(內袋)放進專用的生物危險品處理袋(外袋)，把手套脫下 (將手套向外翻脫下)，並用梘液徹底洗手。
- f. 將所有用過的物品連同膠手套及外科口罩棄於外袋中，及後須再用梘液徹底洗手。
- g. 將所有可再使用的物品消毒，並將可能被沾污的表面，如地面、平台、石階等用 1 份家用漂白水加 49 份水抹拭。
- h. 將生物危險品處理袋送到位於科學館或實驗動物中心的生物廢物收集處，作臨時存放，由生物廢料承辦商收集作進一步處理。
- i. 完成後，徹底洗淨雙手。